

4° ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ



ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS RENAL ASSOCIATION

25-26 Απριλίου 2026

Adams Beach Hotel, Αγία Νάνα



Πληροφορίες &
Εγγραφές



Υπό την αιγίδα



Γραμματειακή
Υποστήριξη



STADA

New perspectives on **IgA nephropathy** with **Kinpeygo®**

KINPEYGO® 4 mg
Hartkapseln mit veränderter
Wirkstofffreisetzung Budesonid

The first and only EMA-approved
therapy specifically for IgAN*

Acts at the primary site of IgAN
production²

Significant reduction in UPCR
over 12 months^{1, **}



Caring for People's Health

* Kinpeygo® is indicated for the treatment of primary immunoglobulin A (IgA) nephropathy (IgAN) in adults at risk of rapid disease progression with a urinary protein/creatinine ratio (UPCR) of ≥ 1.5 g/gram.1 ** Kinpeygo® achieved a 48% greater reduction in UPCR compared to placebo in the overall population after 12 months.1 EMA: European Medicines Agency IgA: Immunoglobulin A IgAN: Immunoglobulin A nephropathy UPCR: Urinary protein/creatinine ratio 1 Summary of Product Characteristics Kinpeygo® 4 mg modified-release hard capsules, as of 07/22. 2 Fellström BC et al. Targeted-release budesonide versus placebo in patients with IgA nephropathy (NEFigan): a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2b trial. Lancet 2017; 389(10084): 2117-2127.

Kinpeygo® 4 mg modified-release hard capsules. Active ingredient: Budesonide. Composition: 1 modified-release hard capsule contains 4 mg budesonide. Other ingredients: Sugar-starch pellets, hypromellose, macrogol, citric acid monohydrate, ethylcellulose, medium-chain triglycerides, oleic acid, titanium dioxide (E171), poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate), talc, dibutylsebacate diolate, shellac, iron(II,III) oxide (E172). Indications: Treatment v. prim. immunoglobulin A (IgA) nephropathy (IgAN) b. adults with a risk of rapid disease progression, with a urine protein/creatinine ratio (UPCR) ≥ 1.5 g/gram. Contraindications: Hypersensitivity to the active ingredient or any of the other components; severe liver dysfunction (Child-Pugh class C). Pregnancy/breastfeeding: Only after careful benefit-risk assessment. Side effects: Symptoms of Cushing's syndrome, diabetes mellitus, blurred vision, hypertension, dyspepsia, skin reactions (acne, dermatitis), muscle spasms, peripheral edema, weight gain, facial edema, and dyspepsia; Side effects of glucocorticoids include, for example, increased blood pressure, increased risk of infection, delayed wound healing, reduced glucose tolerance, sodium retention with edema, muscle weakness, osteoporosis, glaucoma, psychiatric disorders, pulmonary ulcers, and increased risk of thrombosis. Warning: Contains sucrose. Information abbreviated - please refer to the prescribing information or patient information leaflet for further details. Prescription only. Marketing Authorisation Holder: STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel. Local Representative: STADAPHARM GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel. Last updated: June 2022

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 4ο Παγκύπριο Συνέδριο Νεφρολογίας, που πραγματοποιείται φέτος στην Αγία Νάπα. Το συνέδριο αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο και διαρκώς εξελισσόμενο θεσμό για τη νεφρολογική κοινότητα της Κύπρου, αντανακλώντας τη διαρκή προσπάθεια μας για επιστημονική πρόοδο, εκπαίδευση και αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών με νεφρικά νοσήματα.

Το φετινό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της ειδικότητάς μας, καλύπτοντας ένα ευρύ και ουσιαστικό φάσμα θεμάτων που εκτείνονται από τις πειραματοπάθειες και τη μεταμοσχευτική νεφρολογία έως την ογκονεφρολογία, τις λοιμώξεις, την πλάσμαφαίρεση και τις σύγχρονες μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη νέων προσεγγίσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Η συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του συνεδρίου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή των νεότερων συναδέλφων και η ενίσχυση της διεπιστημονικής προσέγγισης αναδεικνύουν τη δυναμική και τις προοπτικές της νεφρολογικής κοινότητας.

Πέραν της επιστημονικής του διάστασης, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και προάγοντας τη δημιουργία νέων συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το συνέδριο απευθύνεται και σε επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων, όπως νοσηλευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες που εμπλέκονται στη φροντίδα ασθενών με νεφρικά νοσήματα, τους οποίους προσκαλούμε να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλουν στον διεπιστημονικό διάλογο.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τους συνδέσμους ασθενών και όλους τους χορηγούς για τη στήριξή τους, η οποία καθιστά δυνατή την επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου

Δρ. Ανδρέας Κουρουκλάρης
Πρόεδρος Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου

Atorstan®

Ατορβαστατίνη



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

Το Atorstan® ανήκει στην κατηγορία των **στατινών**

- Ενδείκνυται ως συμπλήρωμα της δίαιτας για μείωση των αυξημένων επιπέδων της ολικής χοληστερόλης (ολική-C), της LDL-χοληστερόλης (LDL-C), της απολιποπρωτεΐνης B και των τριγλυκεριδίων σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω με πρωτοπαθή υπερκοληστερολαιμία, συμπεριλαμβανομένης της ετερόζυγης οικογενούς υπερκοληστερολαιμίας και της συνδυασμένης (μεικτής) υπερλιπιδαιμίας, όταν η δίαιτα και τα άλλα μη φαρμακολογικά μέτρα δεν επαρκούν
- Ενδείκνυται για τη μείωση της ολικής-C και της LDL-C σε ενήλικες με ομόζυγο οικογενή υπερκοληστερολαιμία ως συμπλήρωμα σε άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες (π.χ. LDL αφαίρεση) ή όταν οι θεραπείες αυτές δεν είναι διαθέσιμες
- Ενδείκνυται για την πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς για τους οποίους εκτιμάται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πρώτου καρδιαγγειακού επεισοδίου, ως συμπλήρωμα στη διάρθρωση άλλων παραγόντων κινδύνου

Φάρμακο χορηγούμενο
μόνο με ιατρική συνταγή

Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών
Χρήσης του προϊόντος



Remedica

Remedica Ltd.

📍 Τ.Κ. 51706, 3508, Λεμεσός, Κύπρος

☎ +357 25 553000 📠 +357 25 390192

✉ info@remedica.com.cy | DrugSafety@remedica.com.cy

🌐 www.remedica.eu

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Διοργάνωση

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου. Τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας), της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Φύλων Νεφροπαθών.

Δ.Σ. Ν.Ε.Κ. 2025-2027

Πρόεδρος: Ανδρέας Κουρουκλάρης
Αντιπρόεδρος: Μαρία Κκολού
Γραμματέας: Γιώργος Τουλκερίδης
Ταμίας: Μιχάλης Σπαρτάλης
Μέλη: Παύλος Γεωργίου, Καρίμ Χιλάλ

Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Ανδρέας Κουρουκλάρης-Πρόεδρος
Μαρία Κκολού
Γιώργος Τουλκερίδης
Μιχάλης Σπαρτάλης
Παύλος Γεωργίου
Καρίμ Χιλάλ
Ελένη Φράγκου
Αλεξία Παναγίδου
Ανδρέας Σολουκιάδης
Πέρσια Στρόππου

Ημερομηνία & χώρος εκδήλωσης

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο Adams Beach Hotel στην Αγία Νάπα.

Εγγραφές-Κόστος συμμετοχής

Η δήλωση της συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου <https://cubix.com.cy/cra26/>



Η συμμετοχή για τα μέλη της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας Ειδικευόμενους και φοιτητές ιατρικής είναι δωρεάν.

Το τέλος συμμετοχής για ιατρούς μη μέλη της ΝΕΚ και ΕΝΕ είναι €20.

Το τέλος συμμετοχής για Άλλους Επαγγελματίες Υγείας είναι €15, και εξοφλείται κατά την εγγραφή στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Το επίσημο δείπνο στις 25/4 προσφέρεται δωρεάν στα Μέλη της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, με προϋπόθεση την εξόφληση συνδρομών και την δήλωση συμμετοχής. Το κόστος συμμετοχής για μη μέλη της ΝΕΚ και εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών ανέρχεται στα €30, με προϋπόθεση τη δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Το συνέδριο αξιολογήθηκε με 9 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνολικής διάρκειας του συνεδρίου.

Το συνέδριο αξιολογήθηκε με 6.55 Διεθνείς Μονάδες Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η Γραμματειακή Υποστήριξη παρέχεται από την εταιρεία Cubix Minds Events.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 70004464.





FABHALTA[®]

ιπτακοπάνη

**ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΕΚΕΙ
ΟΠΟΥ Η ΝΟΣΟΣ ΞΕΚΙΝΑ**



ΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ* ΤΗΣ C3G

* Το FABHALTA[®] είναι η πρώτη θεραπεία για τη C3 σπειραματοπάθεια (C3G) που σας επιτρέπει να στοχεύσετε στη βασική αιτία της νόσου.^{1,2} Δρώντας επί του Παράγοντα Β στην εναλλακτική οδό του συστήματος του συμπληρώματος, το FABHALTA[®] παρέχει μια επιλογή από στόματος χορηγούμενης θεραπείας που μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της νεφρικής λειτουργίας σε ενήλικους ασθενείς με C3G.^{2,3}

Βιβλιογραφία: 1. FABHALTA[®] Summary of Product Characteristics, 18.09.2025. 2. Bomback AS, et al. *Kidney Int Rep.* 2022;7:2150-2159. 3. Smith RJH, et al. *ASN* 2024, 23-27 October; San Diego, CA. SA-OR66.

Συσκευασίες και τιμές: Fabhalta σκληρά καψάκια που περιέχουν 200 mg ιπτακοπάνης, σε συσκευασία με 56 κάψουλες, €2.9242,88.

Πρόσκληση για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην Novartis Pharma Services Inc., Methonis Tower, Λεωφ. Μακαρίου 73, 1070 Λευκωσία, Τηλ: +357 22 690 690 (Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης), Φαξ: +357 22 315 032 ή σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους: • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών <http://www.kitrinikarta.gov.cy> • Εντυπία αποστολή της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμης μέσω της ιστοσελίδας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών <http://www.kitrinikarta.gov.cy> • Μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475, Λευκωσία, Τηλ: +357 22 608 607 - Υποβολή μέσω Φαξ: +357 22 608 669.

NOVARTIS

Novartis Pharma Services Inc.

Methonis Tower, Λεωφόρος Μακαρίου 73, 1070 Λευκωσία, Τηλ: +357 22 690 690, Φαξ: +357 22 496 798



ΠΑΡΑΤΕΤΕ ΕΛΘΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΝΤΑΥΛΟΓΡΑΦΩΣΗΣ FABHALTA



Σάββατο 25/04/26

09:00-09:30 Εγγραφές

09:30-10:45 1η Ενότητα: Πλασμαφαίρεση

Συντονίστριες: **Αλεξία Παναγίδου, Πέρσια Στρόππου**

09:30-09:55 Πλασμαφαίρεση στην σύγχρονη νεφρολογική πράξη.

Ενδείξεις και κλινικές αποφάσεις, **Χριστίνα Μελεξοπούλου**

09:55-10:20 Η πλασμαφαίρεση στα νευρολογικά νοσήματα. Ενδείξεις, timing

και κλινική εμπειρία, **Χριστίνα Αργυροπούλου**

10:20-10:45 Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση σε αιματολογικά νοσήματα, **Ελένη Γαβριλάκη**

10:45-11:15 Δορυφορική Ομιλία



Συντονίστριες: **Μαρίνα Παναγιώτου, Ελένη Φράγκου**



Νεφρολογία πρό και μετά τους SGLT2i, **Αθανάσιος Καμμένος**

11:15-11:45 Διάλειμμα

11:45-12:15 Δορυφορική Ομιλία



Συντονιστές: **Ανδρέας Κουρουκλάρης, Ματθαίος Στυλιανού**

FABHALTA®: Μια νέα εποχή στη διαχείριση της C3G στην Κύπρο, **Λουκάς Δαμιανού**

12:15-12:45 Παράλληλο Session / Workshop - Αίθουσα Victory



Παρακέντηση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης αιμοκάθαρσης (AV Fistula) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση με ασύρματο υπέρηχο Clarius, **Ανδρέας Παναγιώτου**

12:15-13:30 2η Ενότητα: Μεταμοσχευτική Νεφρολογία (session in English)

Συντονιστές: **Ανδρέας Σολουκίδης, Ιωάννης Μπολέτης**

12:15-12:40 Thrombotic microangiopathy in the transplant recipient, **Neil Sheerin**

12:40-13:05 Transplant Histopathology update for the Nephrologist,

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

13:05-13:30 Machine perfusion in kidney transplantation, **Μιχάλης Παπούλας**

13:30-14:00 Δορυφορική Ομιλία



Συντονιστές: **Μαρία Κκολού, Χαράλαμπος Χαραλάμπους**

Αλλάζοντας την πρόγνωση στη ΧΝΝ: Ο ρόλος των αναστολέων SGLT2 στο θεραπευτικό αλγόριθμο, **Ευάγγελος Παπαχρήστου**

14:00-14:45 Ελαφρύ γεύμα

14:45-15:30 Δορυφορική Ομιλία



Συντονιστές: **Ανδρέας Κουρουκλάρης, Μιχάλης Σπαρτάλης**

Στοχεύοντας το συμπλήρωμα στη C3G και την pIC-MPGN: Νέα κλινικά δεδομένα με το Pegcetacoplan, **Σμαραγδή Μαρινάκη**

Συζήτηση: **Ανδρέας Κουρουκλάρης, Ελένη Φράγκου, Σμαραγδή Μαρινάκη, Μιχάλης Σπαρτάλης**

Jardiance®

(εμπαγλιφλοζίνη)

10mg, 25mg

Θεραπευτικές ενδείξεις JARDIANCE®: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Το Jardiance® ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως επικουρικό της διαίτας και της άσκησης - ως μονοθεραπεία όταν η μετεφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας - επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη. **Καρδιακή ανεπάρκεια:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. **Χρόνια νεφρική νόσος:** Το Jardiance® ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 10 Φεβρουαρίου 2025. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές Ελλάδας: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 29,49€, Α.Τ.: 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 30,14€, Α.Τ.: 47,73€. Τιμές Κύπρου: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 51,19€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 53,73€. **ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την
"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπογλυκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονουλιδία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκολιόσπηση, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της ουρικής και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συνολικό προφίλ ασφαλείας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε έγχρηστη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στο τηλ: 210 8906326-328.



Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα. Τηλ: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 424 618.
E-mail: info@eth.boehringer-ingelheim.com
Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd, Βοσ. Παύλου Α' 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: +357 22 863100.



Σάββατο 25/04/26

15:30-16:45 3η Ενότητα: Ογκονεφρολογία

Συντονιστές: **Βαλεντίνος Κουννής, Γεώργιος Τουλκερίδης**

15:30-15:55 Επίπτωση της νεφρικής νόσου στους ογκολογικούς ασθενείς,

Ονούφριος Τσαβαρής

15:55-16:20 Νεότερα Δεδομένα σχετικά με τις επιπλοκές της ανοσοθεραπείας,

Χαράλαμπος Φωτιστζούδης

15:20-16:45 Ενδείξεις βιοψίας νεφρού σε ογκολογικά περιστατικά, **Ανδρέας Κούσιος**

16:45-17:15 Δορυφορική Ομιλία



Συντονιστές: **Καρίμ Χιλάλ, Κυριακός Γιάγκου**

Μη στεροειδικοί ανταγωνιστές των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών:
από τις κλινικές μελέτες στην κλινική πράξη, **Σμαραγδή Μαρινάκη**

17:15-17:45 Διάλειμμα με την ευγενική χορηγία της



17:45-18:15 Δορυφορική Ομιλία



Συντονίστριες: **Παναγιώτα Λουκαΐδου, Γεωργία Αναγνωστοπούλου**

Η εφαρμογή στοχευμένης θεραπείας με Βουδεσονίδη στην IgA Νεφροπάθεια
αλλάζει την πορεία της νόσου και δίνει νέες προοπτικές στην έρευνα,

Μαρία Στάγκου

18:15-19:15 4η Ενότητα: Complement-Mediated diseases (session in English)

Συντονιστές: **Κωνσταντίνος Δέλτας, Χρυσούλα Πιπιλή**

18:15-18:35 CFHR5 Nephropathy: the Cypriot complementopathy, **Daniel Gale**

18:35-19:05 Atypical haemolytic uraemic syndrome – A clinical approach, **Neil Sheerin**

19:05-19:15 Panel discussion

19:00-20:00 Εναρκτήρια τελετή

19:15-19:30 Χαιρετισμοί

Ανδρέας Κουρουκλάρης, Πρόεδρος Νεφρολογικής Εταιρείας

Σωτηρούλα Γλυκύ, Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών

Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, Υπουργός Υγείας Κύπρου

20:30 Επίσημο Δείπνο

Μια κίνηση μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα¹

Για τους ασθενείς σας με ΧΝΝ σχετιζόμενη με ΣΔτ2, παρεμβείτε τώρα προσφέροντας καρδιονεφρική προστασία με το Kerendia



Επιβραδύνετε την εξέλιξη της ΧΝΝ¹



Μειώστε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων^{1*}

Το Kerendia είναι ο πρώτος και μοναδικός μη στεροειδικός ανταγωνιστής του υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών εγκεκριμένος για τη θεραπεία της ΧΝΝ σχετιζόμενης με ΣΔτ2.

Δράστε έγκαιρα με το Kerendia για να επιβραδύνετε την εξέλιξη της ΧΝΝ στους ασθενείς σας με ΣΔτ2 και λευκωματινουρία

Παραπομπή: 1. Kerendia. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος - https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf
* Δείτε την παράγραφο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ)

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. Παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Γνωσάριος:

ΧΝΝ: Χρόνια Νεφρική Νόσος

ΣΔτ2: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

 **Kerendia[®]**
finerenone

 **Bayer**

 **NOVAGEM**

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου
Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγγελάδου 6-8,
15123 Μαρούσι, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 6187500
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου
Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: +357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742
Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλές και
δυνατό
ΟΛΕΙΣ οι ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνονται στη «ΣΤΥΠΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος αρωάστε τον κωδικό QR



Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στην εταιρεία Bayer Hellas



**ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ C3G ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ IC-MPGN
ΗΛΙΚΙΑΣ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ¹**

 **ASPAVELI®** ▼
(pegcetacoplan)

TARGET • CLEAR • PRESERVE

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή ή τη Swedish Orphan Biovitrum AB μέσω email: pv.medical.info.gr@sobi.com

Το ASPAVELI® (πεγκσετακοπλάνη) ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ασθενών ηλικίας 12 έως 17 ετών με C3 σπειραματοπάθεια (C3G) ή πρωτοπαθή ανοσοσυμπλεγματική μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα (IC-MPGN) σε συνδυασμό με αναστολέα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (RAS), εκτός εάν η θεραπεία με αναστολέα RAS δεν είναι ανεκτή ή αντενδείκνυται.¹

C3G = C3 σπειραματοπάθεια, **IC-MPGN** = πρωτοπαθής ανοσοσυμπλεγματική μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα
1. Aspaveli. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Τα Sobi και Aspaveli® είναι εμπορικά σήματα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).
© 2026 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm Sweden <https://www.sobi.com/en>

Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων www.eof.gr ή www.kitrinikarta.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες www.moh.gov.cy/phs
Swedish Orphan Biovitrum AB: drugafety@sobi.com



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη εδώ, ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Sobi στο email: info.greece@sobi.com

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

 **Innopro Healthcare**

Διανομέας στην Κύπρο,
Innopro Healthcare Ltd
Τηλ: +35722483000


Σωρού 12, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα
+302107008100
www.sobi.com/greece/el
email: info.greece@sobi.com

Βαθμίστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-32458
Ημερομηνία προετοιμασίας:
Μάρτιος 2026

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ IgAN ΜΕ ΔΙΤΤΗ ΔΡΑΣΗ¹

FILSPARI® (sparsentan)
για παρατεταμένη μείωση
της πρωτεϊνουρίας και
διατήρηση της νεφρικής
λειτουργίας^{1,2}

Ο καινοτόμος DEARA που
καθυστερεί την εξέλιξη
της IgA νεφροπάθειας
στοχεύοντας ταυτόχρονα
την ενδοθηλίνη και
την αγγειοτενσίνη¹

Το FILSPARI® ενδείκνυται για τη θεραπεία
ενήλικων με πρωτοπαθή νεφροπάθεια
ανοσοσφαιρινής Α (IgAN) με απέκκριση
πρωτεΐνης στα ούρα $\geq 1,0$ g/ημέρα (ή λόγω
πρωτεΐνης προς κρεατινίνη στα ούρα $\geq 0,75$ g/g)¹

*Το FILSPARI® αναστέλλει την ενεργοποίηση τόσο του ET_AR
όσο και του AT₁R, μειώνοντας έτσι την πρωτεϊνουρία και
επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νεφρικής νόσου¹

AT₁R = υποδοχέας τύπου 1 της αγγειοτενσίνης II, **DEARA** = διπλός
ανταγωνιστής των υποδοχέων αγγειοτενσίνης και ενδοθηλίνης,
ET_AR = υποδοχέας τύπου Α της ενδοθηλίνης

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος FILSPARI®.
2. Rovin B, et al. Lancet. 2023;402(10417):2077-90.

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή

Μόνηση Λαβική Ταμπ.

FILSPARI F.C.TAB 200MG/TAB BT X 30 TABS (HDPE BOTTLE): 4.284,39€

FILSPARI F.C.TAB 400MG/TAB BT X 30 TABS (HDPE BOTTLE): 4.284,39€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Genesis Pharma
(Cyprus) Ltd



FILSPARI®
(sparsentan) tablets
200 mg/400 mg

ΔΙΤΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

FIL/ADV/02.2026

Βασήστε να γίνουν τα φάρμακα να ασφαλή και
Ασφαλή
ΟΛΕΣ οι συνιστώμενες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεριλαμβανομένης της «ΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
τον κωδικό QR

GENESIS
pharma

Consulco Building, Οδός Μεταχίου 73,
3ος όροφος, 2407 Έγκωμη, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ: +357 22 765 715
e-mail: info-cyprus@genesishpharmagroup.com
www.genesishpharma.com

CSL Vifor

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Κυριακή 26/04/26

09:10-10:00 5η Ενότητα: Λοιμώξεις

Συντονίστριες: **Μαρία Αρσάλη, Σοφία Κεβρεκίδου**

09:10-09:35 Νεότερα αντιβιοτικά σε νεφρική νόσο, **Νικόλαος Σπερνοβασίλης**

09:35-10:00 Ενδοκαρδίτιδα και λοιμώξεις από κεντρικού φλεβικούς καθετήρες ΚΦΚ, **Κώστας Κωνσταντίνου**

10:00-10:30 Δορυφορική Ομιλία



Συντονιστές: **Ανδρέας Σολουκίδης, Χρυσούλα Πιπιλή**

Διάγνωση και θεραπεία στο aHUS: νεότερα δεδομένα και προοπτικές, **Στέλλα Σταμπουλή**

10:30-11:00 6η Ενότητα: Special Lecture

Συντονιστές: **Κυριάκος Ιωάννου, Χρίστος Καλλής**

10:30-11:00 From Data to Drug: Using RaDaR in the Fight Against Rare Kidney Disease, **Daniel Gale**

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:00 Δορυφορική Ομιλία



Συντονιστές: **Αλεξία Παναγίδου, Παύλος Γεωργίου**

Το εξελισσόμενο θεραπευτικό τοπίο στην IgAN: ο ρόλος της διττής δράσης του Sparsentan, **Σμαραγδή Μαρινάκη**

12:00-12:50 7η Ενότητα: Ποδοκυτταροπάθειες

Συντονιστές: **Ελένη Φράγκου, Θεοφάνης Θεοφάνους**

12:00-12:25 Ποδοκυτταροπάθειες σε παιδιά, **Στέλλα Σταμπουλή**

12:25-12:50 Ποδοκυτταροπάθειες σε ενήλικες, **Θανάσης Καρμένος**

12:50-13:20 Δορυφορική Ομιλία



Συντονιστές: **Παρασκευή Παυλάκου, Μιχάλης Σπαρτάλης**

Person-centred Peritoneal Dialysis, **Alexandra Skinder-Ludwig**

13:20-14:00 Διάλειμμα

14:00-15:30 8η Ενότητα: Μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (περιτοναϊκή κάθαρση / αιμοκάθαρση)

Συντονιστές: **Μιχάλης Σπαρτάλης, Σωτηρούλα Γλυκύ**

14:00-14:25 Περιτοναϊκή κάθαρση - Πλεονεκτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης και γιατί πρέπει να την επιλέγουμε, **Χρυσόστομος Δημητριάδης**

14:25-14:50 High Volume HDF: Οφέλη και προκλήσεις, **Σοφία Κεβρεκίδου**

14:50-15:30 9η Ενότητα: Παρουσίαση περιστατικών και βράβευση καλύτερης εργασίας
Συντονιστές: **Ανδρέας Κουρουκλάρης, Μιχάλης Σπαρτάλης, Ελένη Φράγκου**

14:50-15:00 Σειρά περιστατικών κρουσφαιριναιμίας: Πρώτη καταγραφή στην Κύπρο, **Φωτεινή Δημητρίου**

15:00-15:10 Σπάνια περίπτωση ασθενούς με Σύνδρομο Job και Νεφρική Συμμετοχή, **Αυγουστίνη Κυριακού**

15:10-15:20 Δευτεροπαθής Θρομβωτική Μικροαγγειοπάθεια με γενετική προδιάθεση που πυροδοτήθηκε από εκλυτικούς παράγοντες, **Λουκία Ασαέλωφ**

15:20-15:30 Απονομή Βραβείου ERA Φωτεινή Δημητρίου για την εργασία «Σειρά περιστατικών κρουσφαιριναιμίας: Πρώτη καταγραφή στην Κύπρο»



ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ



1. ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑΣ: ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Φωτεινή Δημητρίου¹, Μαρίνα Τσιώτσια¹, Γεώργιος Ζαγκότσης¹, Σοφία Αναστασιάδου¹, Γεωργία Αναγνωστοπούλου², Άριστος Αριστοδήμου¹, Ιωάννης Παυλίδης¹, Άριστος Μιχαήλ¹, Νεκτάριος Παπάς³, Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος³, Προδρομούλα Μιλτιάδους¹, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης⁴, Αθανάσιος Καμμένος¹, Ελένη Φράγκου¹

¹Γ.Ν. Λεμεσού, ²Γ.Ν. Πάφου, ³Πολυκλινική «Υγεία», ⁴Γ.Ν. Λευκωσίας

2. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ Β ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ

Α. Θεμιστοκλέους¹, Μ. Σπαρτάλης^{1,2}, Λ. Ασαέλωφ¹, Σ. Κεβρεκίδου^{1,2}, Α. Κυριάκου¹, Μ. Στυλιανού¹, Π. Στρόππου^{1,2}, Θ. Χριστοφί¹, Α. Παναγίδου^{1,2}, Μ. Αρσάλη^{1,2}, Θ. Θεοφάνους^{1,2}, Ν. Μιτσίδης^{1,2}, Κ. Μιχαηλίδης³, Κ. Δημητρίου¹

¹Νεφρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ²Cyprus Kidney Care Research & Innovation Unit, Medical School, University of Cyprus, ³Παθολογοανατομικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

3. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΑΤΥΠΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ (ΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ)

Αθανάσιος Καμμένος^{1*}, Ανδρέας Σολουκίδης^{2*}, Μιχάλης Σπαρτάλης^{3*}, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης^{4*}, Γεώργιος Ζαγκότσης¹, Μαρία Ζαϊμή⁵, Σοφία Αναστασιάδου¹, Μαρίνα Τσιώτσια¹, Φωτεινή Δημητρίου¹, Νεκτάριος Παπάς⁶, Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος⁶, Άριστος Μιχαήλ¹, Κυπρούλλα Δημητρίου³, Ελένη Φράγκου^{1,5,7}

*Ίση συμμετοχή

¹Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ²Κέντρο Μεταμόσχευσης Οργάνων, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ³Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ⁴Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ⁵Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ⁶Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Πολυκλινική Υγεία, ⁷Τμήμα Βασικών και Κλινικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

4. ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΘΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ANTI-GBM ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μ. Στυλιανού¹, Μ. Σπαρτάλης^{1,2}, Σ. Κεβρεκίδου^{1,2}, Μ. Αρσάλη^{1,2}, Θ. Χριστοφί¹, Π. Στρόππου^{1,2}, Α. Παναγίδου^{1,2}, Λ. Ασαέλωφ¹, Θ. Θεοφάνους^{1,2}, Α. Κυριάκου¹, Α. Θεμιστοκλέους¹, Ν. Μιτσίδης^{1,2}, Κ. Μιχαηλίδης³, Κ. Δημητρίου¹

¹Νεφρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ²Cyprus Kidney Care Research & Innovation Unit, Medical School, University of Cyprus, ³Παθολογοανατομικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

5. ΗΠΑΤΟΝΕΦΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ, ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑΣ

Πετρίδου Η.¹, Χαράλαμπος Α.¹, Παπουρής Γ.¹, Ξενοφώντας Ε.¹, Δραμιώτου Α.¹

¹Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

6. ΑΚΡΑΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ

Αθανάσιος Καμμένος¹, Γεώργιος Ζαγκότσης¹, Σοφία Αναστασιάδου¹, Μαρίνα Τσιώτσια¹, Φωτεινή Δημητρίου¹, Άριστος Μιχαήλ¹, Γεώργιος Μενοίκου², Νεκτάριος Παπάς^{3,4}, Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος^{3,4}, Ελένη Φράγκου¹

¹Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ²Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ³Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Πολυκλινική Υγεία, Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο Mediterranean



7. ΟΥΡΑΙΜΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ: ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Μαρίνα Τσιώτσια¹, Φωτεινή Δημητρίου¹, Γεώργιος Ζαγκότσης¹, Σοφία Αναστασιάδου¹, Άριστος Μιχαήλ¹, Νεκτάριος Παππάς², Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος², Προδρομούλα Μιλτιάδους¹, Αθανάσιος Καμμένος¹, Ελένη Φράγκου¹

¹Γ.Ν. Λεμεσού, ²Πολυκλινική «Υγεία»

8. ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΘΡΟΜΒΩΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ: ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τριαντάφυλλος Γιαννακόπουλος^{1,2}, Νεκτάριος Παπάς^{1,2}, Κωνσταντίνος Βασιλάς¹, Γιώργος Ζαγκότσης³, Παύλος Γεωργίου⁴, Αθανάσιος Καμμένος³, Ελένη Φράγκου³

¹Άγγειοχειρουργικό Τμήμα, Πολυκλινική Υγεία, ²Άγγειοχειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο Mediterranean, ³Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ⁴Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος.

9. ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ MYCOBACTERIUM CHELONAE ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Ελισάβετ Γεωργίου¹, Αθανάσιος Καμμένος², Γεώργιος Ζαγκότσης², Δέσπω Πιερίδου³, Παναγιώτα Μαϊκαντή³, Λουκία Δραμίζωτου¹, Έλενα Φράγκου², Άριστος Αριστοδήμου¹

¹ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ΟΚΥνηΥ, Λεμεσός, ²Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ΟΚΥνηΥ, Λεμεσός, ³ Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ΟΚΥνηΥ, Λευκωσία

10. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΚΛΑΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Λ. Ασαέλωφ¹, Μ. Σπαρτάλης^{1,2}, Μ. Στυλιανού¹, Α. Θεμιστοκλέους¹, Α. Κυριάκου¹, Σ. Κεβρεκίδου^{1,2}, Α. Παναγίδου^{1,2}, Θ. Χριστοφί¹, Π. Στρόππου^{1,2}, Μ. Αρσάλη^{1,2}, Θ. Θεοφάνους^{1,2}, Ν. Μισσίδης^{1,2}, Κ. Μιχαηλίδης³, Κ. Δημητρίου¹

¹Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Κύπρος, ²Μονάδα Έρευνας και Καινοτομίας Νεφρικής Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, ³Ιστοπαθολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Κύπρος

11. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ JOB ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Α. Κυριάκου¹, Α. Παναγίδου^{1,2}, Π. Στρόππου^{1,2}, Θ. Χριστοφί¹, Σ. Σπαρτάλης^{1,2}, Λ. Ασαέλωφ¹, Σ. Κεβρεκίδου^{1,2}, Μ. Στυλιανού¹, Α. Θεμιστοκλέους¹, Μ. Αρσάλη^{1,2}, Θ. Θεοφάνους^{1,2}, Ν. Μισσίδης^{1,2}, Κ. Μιχαηλίδης³, Κ. Δημητρίου¹

¹Νεφρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ²Cyprus Kidney Care Research & Innovation Unit, Medical School, University of Cyprus, ³Παθολογοανατομικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ





Daniel Gale, Professor of Nephrology, University College London

Neil Sheerin, Professor of Nephrology, Translational and Clinical Research Institute, National Renal Complement Therapeutics Centre, Newcastle University

Alexandra Skinder-Ludwig, Director Global Home Marketing, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Dipl. Ing & BBA

Χριστίνα Αργυροπούλου, Νευρολόγος, Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Λευκωσίας, ΟΚΥΠΥ

Λουκία Ασαέλωφ, MD, Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν. Λευκωσίας, ΟΚΥΠΥ

Ελένη Γαβριλάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λουκάς Δαμιανού, MD, PhD, Medical Director, Nemesos Nefrology Clinic

Μάκης Δημητριάδης, MD, PhD, Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Φωτεινή Δημητρίου, MD, Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν. Λεμεσού, ΟΚΥΠΥ

Θανάσης Καμμένος, MD, Νεφρολόγος, Γ.Ν. Λεμεσού, ΟΚΥΠΥ

Σοφία Κεβρεκίδου, MD, MSc, Νεφρολόγος, Γ.Ν. Λευκωσίας, ΟΚΥΠΥ

Ανδρέας Κούσιος, MD, MSc, FRCP, Σύμβουλος Νεφρολόγος, Nefrontida Medical Centre και Κλινικός Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, European University of Cyprus

Αυγουστίνη Κυριάκου, MD, Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν. Λευκωσίας, ΟΚΥΠΥ

Κώστας Κωνσταντίνου, MD, PhD, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Μονάδα Λοιμώξεων / Παθολογική Κλινική / Γ.Ν. Λευκωσίας, ΟΚΥΠΥ, ΜΕΕ & ΕΛΝ / ΙΥΔΥ / Υπ. Υγείας

Σμαραγδή Μαρινάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Διευθύντρια Κλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Λαϊκό

Χριστίνα Μελεξοπούλου, MD, PhD, Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, MD, MSc, Παθολογοανατόμος

Ανδρέας Παναγιώτου, Κλινικός Εκπαιδευτής Αιμοκάθαρσης, Γ.Ν. Λευκωσίας, ΟΚΥΠΥ

Ευάγγελος Παπαχρήστου, Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας – Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Νεφρολογικού και Μεταμοσχευτικού Κέντρου ΠΓΝ Πατρών

Μιχάλης Παπούλας, MD, FEBS, Χειρουργός Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων και Μεταμοσχεύσεων, Γ.Ν. Λευκωσίας, ΟΚΥΠΥ / El Greco Medical Centre

Νικόλαος Σπερνοβασίλης, BSc, MD, MPH, PhD, Διευθυντής Τμήματος Λοιμώξεων, Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, Λεμεσός

Μαρία Στάγκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας Α.Π.Θ., Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Στέλλα Σταμπουλή, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ονούφριος Τσαβαρής, MD, MSc, Ογκολόγος, Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, Λεμεσός

Χαράλαμπος Φωτισιτζούδης, MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, Λεμεσός

Innovation, Reliability, and Quality in Healthcare

With a legacy dating back to 1904, **Costas Christodoulou Ltd** is a proud family-owned business and a trusted name in Cyprus.

For nearly 60 years, we've been at the forefront of **healthcare technology**, offering high-quality medical devices and expert support services, tailored to the needs of modern healthcare professionals.

Our Healthcare Solutions Include:

♦ **Advanced Medical Imaging**

Digital X-ray systems, ultrasound, CTs, MRIs, mammography, DXA, surgical C-arms, dental radiology, digitizers, film printers, and X-ray films.

♦ **Cutting-Edge Health IT**

PACS/RIS, radiation dose management, AI software, speech recognition software, diagnostic monitors, and CD publishing systems.

♦ **Reliable Hospital Equipment**

From patient monitoring to ICU and OR set-ups, we deliver complete solutions, designed for performance and durability.

For more information, contact us today:

22 Theofani Theodotou, 1065 Nicosia, Cyprus

T.: +357 22 67 98 22

E.: info@costaschristodoulou.com.cy



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines.

ΧΟΡΗΓΟΙ



ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ



Bayer



ΧΡΥΣΟΙ



AstraZeneca



Boehringer
Ingelheim



Costas Papaellinas
Group of Companies
papaellinas.com



NOVARTIS

ΑΡΓΥΡΟΙ



HEALTHCARE
By Costas Christodoulou Ltd



GA
Stamatis
& Co



CHEPLA
PHARM



P.T. Χατζιγεωργίου co ltd



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ



Remedica



Let's talk person-centered PD

The latest ISPD guideline on peritoneal dialysis (PD) prescribing emphasizes a person-centered, shared decision-making approach that considers the individual's broader challenges.¹

As your partner for person-centered PD we support you at every stage of the journey with:

- user-friendly PD systems designed for intuitive use across diverse patient abilities
- fully personalized PD prescription options
- easy-to-understand therapy management systems

Visit [freseniusmedicalcare.com](https://www.freseniusmedicalcare.com) to learn more!

¹ Brown EA, et al. Perit Dial Int. 2020;40(3):244-253.




forxiga
(dapagliflozin)

**Όταν η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
γίνεται
ΕΠΙΛΟΓΗ**



Συγκεκριμένα διαβάστε τύπου 2. Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ως συμπληρωματική θεραπεία στη δίαιτα και την άσκησης μονοθεραπεία, όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας. Επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Καρδιακή ανεπάρκεια: Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

Χρόνια νεφρική νόσος: Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Για τα αποτελέσματα των μελετών σε σχέση με τον συνδυασμό των θεραπειών, τις επιδράσεις στον γλυκαιμικό έλεγχο, τα καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάντα και τους πληθυσμούς που μελετήθηκαν, βλέπε παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.1 της ΠΧΠ.

Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στις κλινικές μελέτες σε ασθενείς με ΣΔ2, ήταν οι γεννητικές λοιμώξεις. Πολύ συχνές ή υπολογισμαίως όταν συγχρησιμοποιείται με SU ή ινσουλίνη. Άλλες συχνές που έχουν καταγραφεί είναι οι σκόληνες, όλη, εξάνθημα, σπασμολγία, δύσπνοια, πονοκεφαλγία, αυξημένος σπασμολγία, μειωμένη νεφρική καθαρότητα κρεατινίνης κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας, δυσλιπιδαιμία. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της dapagliflozin σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο ήταν ανενεργές με το γνωστό προφίλ ασφάλειας της dapagliflozin.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ΠΧΠ για την πλήρη λίστα ανεπιθύμητων ενεργειών.

Forxiga F.C Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοδραστική dapagliflozin με προπαιοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg dapagliflozin.

Εκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg ανδρικής λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ενδεικτικές Α.Τ. κατά την έκδοση Α.Τ. Ε49.34

Το φάρμακο αποθηκεύεται από το ΓΕ.Υ.

Πριν την αντανάγνωση συμβουλευτείτε την πλήρη ΠΧΠ που μπορείτε να βρείτε

στο QR code ή στο www.papalolizou.com



Βεβαιωθείτε ότι είναι το φάρμακο για ασφαλή και
αναφέρεται OMS στις ανεπιθύμητες ενέργειες για OLA
τα φάρμακα συμπεριλαμβανομένης της «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

AstraZeneca

ΑΛΕΚΤΩΡ

Λεωφόρος Κίλικς 35
2234 Λατοιά, Κύπρος
Τηλ: +357 22 490305
www.papalolizou.com